Varicex® S - opaska dziana z pastą cynkową 10cm x 7m (20 631)

Cena: 45,90 pln

Opis słownikowy

Producent	Lohmann-Rauscher
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Impregnowana pastą cynkową dziana opaska Varicex® S o rozciągliwości wzdłużnej i poprzecznej o krótkim naciągu odpowiednia do bandaży typu Unna Boot. Bandaż służy do stosowania do kompresji, do stabilizacji i odciążania, a także do unieruchamiania pewnych części ciała.

Przy pomocy tworzy się półsztywne opatrunki stałe we wskazaniach takich jak: żylaki, przewlekła niewydolność żylna, leczenie obrzęku, zakrzepowe zapalenie żył, owrzodzenie podudzia w fazie gojenia oraz w okresie rekonwalescencji po złamaniach.

Właściwości:
- bielastyczna - o rozciągliwości wzdłużnej i poprzecznej
- dobrze rozciągliwa
- łatwa do nałożenia
- gotowa do użycia
- odpowiednia do opatrunków wykonywanych techniką okrężną
- nadaje się także do stożkowatych części ciała
- pakowana pojedynczo w woreczku z folii aluminiowej

Długość po rozciągnięciu: 10cm x 7m

Materiał nośny: 80% wiskoza, 20% poliamid – powlekany pastą cynkową

Wskazania:
- Kontuzje, skręcenia, urazy ścięgien i zwichnięcia.
- Wskazania flebologiczne i limfologiczne: żylaki, zakrzepowe zapalenie żył, niewydolność żył głębokich, zespół pozakrzepowy,

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z lekarzem. Dokładamy wszelkich starań, aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Ze względu na indywidualne ustawienia monitorów prezentowane kolory mogą różnić się od rzeczywistych. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o informacje.

zakrzepica żylna, przewlekła niewydolność żylna w stadium I do III b (wg Widmera), owrzodzenie podudzia żylne i mieszane, obrzęki (żylne, limfatyczne, tłuszczowe, w tym pourazowe, pooperacyjne, w czasie ciąży), po skleroterapii i zabiegach chirurgicznych żył.

Przygotowanie do użycia:
- Przed założeniem opatrunku oczyścić ranę jeśli taka występuje lub opracować łożysko oraz okryć opatrunkiem odpowiednio do jej stanu.
- Ewentualnie wyściełać narażone na ucisk miejsca.
- Opatrunek najlepiej zakładać rano przed wstaniem z łóżka lub po dłuższej chwili trzymania nogi w górze.
- Szerokość bandaża powinna odpowiadać średnicy części ciała, na którą ma być założony.

Stosowanie:
- Technikę nakładania zwojów opaski Varicex® S należy uzgodnić z lekarzem prowadzącym leczenie.
- Aby uzyskać maksymalną ruchomość stawu, zaleca się zakładanie opatrunku na stopę zgiętą pod kątem prostym (90°).
- Opatrunek należy zakładać tak, aby nie powstały luki.
- Zawinięta część bandaża (zwój bandaża) jest zwrócona na zewnątrz. Zwój bandaża należy poprowadzić ciasno przy nodze/ramieniu.
- Jeżeli opatrunek ulegnie poluzowaniu, to należy go zmienić.
- Z uwagi na jego bi-elastyczność, bandaż Varicex® S można modelować bez wielokrotnego nacinania i docinania. Opatrunek gładko dopasowuje się do kończyny.
- Po założeniu, opatrunek z pastą cynkową należy zabezpieczyć za pomocą rękawa opatrunkowego tg ® lub opaski podtrzymującej.

Opaski z pastą cynkową Varicex® zużywają się w niewielkim stopniu - niezależnie od tego, czy stosowane są z elastyczną opaską w systemie okrężnym, czy systemie półósemkowym.

Przeciwwskazania:
Zastoinowa niewydolność serca, zaawansowana choroba tętnic obwodowych, posocznicze zapalenie żył, siniczy obrzęk bolesny, zaburzenia czucia w skórze, znane alergie i/lub nadwrażliwość na składniki produktu.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z lekarzem. Dokładamy wszelkich starań, aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Ze względu na indywidualne ustawienia monitorów prezentowane kolory mogą różnić się od rzeczywistych. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o informacje.