

NEOCIDE Spray z octenidyną 50ml

Cena: 19,99 pln



Opis słownikowy

Pojemność	50ml
Producent	Phyteneo
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Gotowy do użycia antyseptyczny płyn Neocide to roztwór wodny z octenidyną zapobiegający infekcjom skóry i błon śluzowych.

Obszar zastosowania:

- pielęgnacja i oczyszczania jamy ustnej zewnętrznej
- antyseptyczne płukanie jamy ustnej przed i po zabiegach w obrębie jamy ustnej
- antyseptyczne mycie błon śluzowych
- pielęgnacja i oczyszczania skóry ciała
- antyseptyczne oczyszczanie skóry przy zapaleniu skóry
- pielęgnacja, przemywanie i oczyszczanie szwów operowanego miejsca
- w higienie intymnej
- pielęgnacja oparzeń (również po opalaniu)
- pielęgnacja drobnych urazów (zadrapania, otarcia, rany cięte)
- przed badaniami i zabiegami w ginekologii, urologii, dermatologii, geriatry, wenerologii, stomatologii
- w salonach manicure i pedicure do przemywania skóry wokół paznokci po wykonanych zabiegach
- w kosmetologii, do przemywania i odkażania skóry podczas zabiegów kosmetycznych

Właściwości:

- Zawiera 0,1 octenidyny.
- Wspomaga regenerację skóry oraz błony śluzowej.
- Nie powoduje pieczenia.
- Może być stosowany przez kobiety w ciąży i w okresie laktacji.
- Produkt bezpieczny dla dzieci, diabetyków i pacjentów z osłabioną odpornością.
- Do stosowania bez ograniczeń wiekowych.
- Wygodna do aplikowania forma sprayu.
- Nie brudzi, nie plami ubrań, nie przebarwia.

- Produkt bezbarwny - nie zakłóca wzrokowej oceny miejsca stosowania.
- Wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze już po 30 sekundach, a działanie przeciwwirusowe po 1 min.
- Hamuje rozwój drobnoustrojów.

Sposób użycia:

Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego.

Miejsce noszące znamiona infekcji równomiernie spryskać płynem, następnie pozostawić do wyschnięcia.

Zgodnie z potrzebą można zastosować ponownie w ciągu dnia, do 5 razy na dzień.

Przeciwwskazania:

Nie stosować u osób ze stwierdzoną alergią na jakikolwiek składnik produktu lub w przypadku nadwrażliwości na jeden ze składników.

Uwaga! Nie stosować jednocześnie ze środkami antyseptycznymi na bazie jodu PVP i anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi. Po przypadkowym spożyciu wypić większą ilość wody i zwrócić się do lekarza.

Skład:

0,1% Octenidine HCl, Aqua, Glycerin, Propylene glycol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Sodium gluconate, Cocamidopropyl Betaine, Hydroxyethylcellulose, Citric Acid

Opakowanie: 50 ml