

Orteza nadgarstka Professional Line Manus Forte ACTIMOVE 73482 - prawa

Cena od: 199,90 pln



Opis słownikowy

Producent	Actimove
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Orteza nadgarstka stosowana w celu jego unieruchomienia zapewniająca wysoki komfort użytkowania i swobodne ruchy palców.

Produkt należy do linii wyrobów Actimove Professional Line, przeznaczonych do stosowania przy poważnych urazach i chorobach ortopedycznych wymagających skutecznego wsparcia procesu gojenia i złagodzenia bólu.


Właściwości:

- produkt odpowiedni do codziennego noszenia, umożliwi swobodne ruchy palców przy jednoczesnym unieruchomieniu nadgarstka
- po wyjęciu unieruchomienia po wewnętrznej stronie jest odpowiedni do stosowania w późnej rehabilitacji wymagającej mniejszej stabilizacji
- dzięki solidnemu i pewnemu ustabilizowaniu nadgarstka w funkcjonalnej pozycji wspomaga łagodzenie bólu
- zapobiega zgięciu i prostowaniu nadgarstka dzięki połączeniu szerokiej, opasającej, nieelastycznej taśmy w środkowej części i sztywnego unieruchomienia z aluminium
- posiada szeroki otwór na kciuk o miękkich krawędziach zapewniający pełną ruchomość palców i komfort użytkowania
- dzięki regulacji anatomicznie wyprofilowanego, aluminiowego unieruchomienia indywidualnie się dopasowuje
- konstrukcja przypominająca rękaw ułatwia zakładanie, obsługę i zdejmowanie ortezy jedną ręką
- posiada zapięcie na rzep uniemożliwiające wysunięcie się pasków z klamer
- wykonana bez użycia naturalnego lateksu, miękki oddychający materiał wewnątrz nie podrażnia skóry i zapewnia komfort noszenia
- łatwa w czyszczeniu i utrzymaniu higieny, po wyjęciu aluminiowego unieruchomienia może być prana w pralce w temperaturze 30°C

Produkt dostępny w trzech rozmiarach XS-XL w wersji na prawą rękę.

Actimove® Manus Forte

Wrist Brace

	Nr art.		Rozmiar	Wymiary	Kolor
	Lewa	Prawa			
	73482-00002	73482-00001	XS	≤ 14 cm	Czarny
	73482-00004	73482-00003	S/M	14-19 cm	Czarny
	73482-00006	73482-00005	L/XL	19-23 cm	Czarny

Zastosowanie:

Choroba zwyrodnieniowa stawów
Reumatoidalne zapalenie stawów
Choroby zapalne (np. zespół de Quervaina, zapalenie pochewek ścięgnistych)
Skręcenia i naciągnięcia
Urazy tkanek miękkich
Postępowanie po zdjęciu opatrunku gipsowego
Okres pooperacyjny

Kolor: czarny